

# Pflanzensteckbriefe

## Weidenblättriges Rindsauge (*Buphtalmum salicifolium*)



**Beschreibung:**

20-50 cm hoch. Blüten gelb. Köpfe einzeln oder zu wenigen am Ende der Zweige, Durchmesser 3-6 cm

**Standort:**

Sonnige, durchlässige und nährstoffreiche Böden

**Verbreitung:**

Mittel- und südosteuropäisch

**Blütezeit:**

Juli - September

## Wiesenflockenblume (*Centaurea jacea*)



**Beschreibung:**

30-70 cm hoch. Blüht rosa bis purpur

**Standort:**

Durchlässige, eher humusarme, mässig trockene Böden (sonnig)

**Verbreitung:**

Europa und Asien

**Blütezeit:**

Juni - Oktober

## Gewöhnliche Wiesen Schafgarbe (*Achillea Milefolium*)



**Beschreibung:**

20-80 cm hoch, Grundständige Blätter, die in Dolden angeordneten Blüten sind weiss, seltener rosa.

**Standort:**

Lockere, nährstoffreiche Böden (sonnig bis halbschattig)

**Verbreitung:**

Europa

**Blütezeit:**

Juli - September

### Rotes Seifenkraut (*Saponaria ocymoides*)



**Beschreibung:**

10-30 cm hoch, niederliegend, aufsteigend mit Rasen bildenden Trieben. Blüten am Ende der Zweige in Büscheln. Kronblätter rot

**Standort:**

Sonnige und durchlässige Böden

**Verbreitung:**

Mittel- und südwesteuropäisch

**Blütezeit:**

Mai - September

### Zimbelkraut (*Cymbalaria muralis*)



**Beschreibung:**

Stängel 10-30 cm, fadenförmig, niederliegend oder hängend. Krone hellviolett, mit hellgelbem Gaumen, wintergrün

**Standort:**

Durchlässige, humus- und nährstoffreiche Böden (halbschattig)

**Verbreitung:**

Mittel- und südosteuropäisch

**Blütezeit:**

Juni - September

### Echtes Labkraut (*Galium verum*)



**Beschreibung:**

20-70 cm hohe, ausdauernde krautige Pflanze. Die gold- bis zitronengelben rispigen Blütenstände riechen intensiv nach Honig.

**Standort:**

Sonnige nährstoffarme Standorte, anspruchslos

**Verbreitung:**

Mittel- und südosteuropäisch

**Blütezeit:**

Mai - September

### Kriechendes Gipskraut (*Gypsophila repens*)



**Beschreibung:**

10-25 cm hoch, aufsteigend, Blätter lineal, bis 3 cm lang. Blüten in rispigen Blütenständen. Kronblätter weiss oder rosa

**Standort:**

Durchlässige und kalkhaltige Böden, geschützte sonnige Standorte

**Verbreitung:**

Mittel- und südosteuropäisch

**Blütezeit:**

Mai - August

### Feld Witwenblume (*Knautia arvensis*)



**Beschreibung:**

30-50 cm hoch, Korbform, zusammengesetzt aus bis zu 50 Blüten, blau- bis rotviolett

**Standort:**

Trockene, sandige und durchlässige Böden (sonnig)

**Verbreitung:**

Mittel- und südosteuropäisch

**Blütezeit:**

Juli - August

### Prachtnelke (*Dianthus superbus*)



**Beschreibung:**

20-60 cm hoch, Blätter lineal-lanzettlich, Kronblätter 15-30 mm lang, bis über die Mitte fransig zerschlitzt, lila bis hellpurpurn

**Standort:**

Sonnig bis halbschattig, leicht feuchte Böden

**Verbreitung:**

Europa und Asien

**Blütezeit:**

Juni - September

## Gewöhnliche Wiesenmargerite (*Leucanthemum vulgare*)



**Beschreibung:**

50-100 cm hoch, Blüten weiss -gelb, Stängel meist verzweigt und mehrköpfig,

**Standort:**

Nährstoffreiche, durchlässige Böden (halbschattig bis sonnig)

**Verbreitung:**

Europa, Asien

**Blütezeit:**

Juni - Oktober